Directeur-Gérant : H. SIMON Station 8

AUERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE CPP Nº 536 A D

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

- BIPCORD G (Cyreginathrine) - DECIS MG (Deltamethrine)

EDITION DE LA STATION "ILE DE FRANCE"

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX. 107 bis, rue du Faubourg Saint-Denis. 1920 PARIS 47, rue Paul Doumer, 93100 MONTREUIL - Tél. 287.76.71

Régisseur de Recettes - D.D.A-P.V-Services Vétérinaires (Recgime) city

of Microphys Larger Lasten BULLETIN No. 256 - 12 JUILLET 1984 CYMENSH, WAFIL SUPER, RIRCORD.S.), waldré laur bonne afficacité vis-à-vis de la

pyrale , risque de provoquer des pullulations de pucerons. EDITION GRANDES CULTURES - ENVOI Nº 10

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

PUCERONS:

Apparus timidement il y a une quinzaine de jours, ils sont en recrudescence

Les trois espèces sont présentes, mais le Sitobion est largement majoritaire, On ne dénombre que rarement plus de 300 pucerons par plante, toutes espèces confondues. Le Métopolophium , le plus dangereux, se situe de 30 à 150 par plante, le plus souvent autour de 100. Les 2/3 des individus se trouvent sous les feuilles de la base, très peu sont dans le cornet.

Parmi les produits utilisés contre pucerons des céréales, le PIRIMOR G

bonne efficacité et une faible toxicité pour la faune auxillaire,

SUIVEZ LA SITUATION PYRALE

Compte tenu du stade du mais et des orages en cours, nous déconseillons ... les traitements aphicides dans l'immédiat. inomega**rourefols,** au inledis, a politicação al premelleuisa, o(fysiciem) our believe no

Une application devrait evoir lieu avant les procheines pluies. Les observations doivent reprendre après le week end du 14 juillet.

REMARQUE: Dans certaines situations, un traitement peut se justifier . C'est le cas pour les mais très chétifs portant environ 200 pucerons par plante (en moyenne sur 20 plantes). Même dans ces cas là, il est préférable d'attendre quelques jours et de refaire un comptage après les orages éventuels.

PYRALES: in de la proliferation des la confer la proliferation des la la proliferation des la proliferation des

Pour l'ensemble de la région, on pourra envisager des traitements à partir de la fin de la semaine prochaine (à partir du 20/7). Seules, 2 régions sont plus précoces que l'ensemble : il s'agit de la zone maraîchère de la Vallée de la Seine à l'Ouest de PARIS et le pourbour Sud de la fôret de Fontainebleau, qui devront être traitées en priorité.

De toutes façons, un traitement se justifie si 10 pieds sur 100 portent une ponte.

(C SPV, 1986) " Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation ".

the second of th

. La région de la Chapelle la felne nous signale des pontes importantes le traitement doit être avance de quelques jours.

. Areached, Laurice

Quels produits utiliser :

PYRALES:

Parmi les spécialités microgranulées présentant une efficacité staisfaisante nous pouvons citer :

- DURSBAN 1,5 G (Chlorpyriphoe éthyl)
- VOLATON (Phoxime)
- PERTHRINE MG (Perméthrine)
- RIPCORD G (Cyperméthrine)
- DECIS MG (Deltaméthrine)

TOUTES CES SPECIALITES DOIVENT ETRE EPANDUES A RAISON DE 25Kg/HA)

Nous rappelons que l'utilisation de pyréthrinoïdes liquides (DECIS, SUMICIDIN 10, CYMBUSH, KAFIL SUPER, RIPCORD 5), maldré leur bonne efficacité vis-à-vis de la pyrale, risque de provoquer des pullulations de pucerons.

PUCERONS:

Parmi les produits utilisés contre pucerons des céréales, le PIRIMOR G allié une bonne efficacité et une faible toxicité pour la faune auxiliaire.

SUIVEZ LA SITUATION PYRALE ET PUCERONS Apparus timidement 11 y a une qu en recrudescence AU REPONDEUR : 858/06/15

Les trois espèces sont présentes, mais le Siteblem est largement meteritaire.

On se dénombre que recomment plus de 300 parcie UOIDIM POMMES DE TERRE

Des sorties de taches se sont produites entre le 23 et le 27 juin. Elles correspondent à l'observation des premiers foyers en cultures. (Nord SEINE & MARNE). Aucune contamination n'a eu lieu depuis.

Utiliser de préférence, une spécialité avec une matière active pénétrante (Cymoxanile) ou systémique (métalaxyl). Actuellement la végétation a atteint un fort développement Une application devrait avoir lieu avant les prochaines pluies. Attention aux orages . L'ACYLON P. est interdit 15 jours avant la récolter

PUCERONS VERTS : Présence de pucerons verts sur toutes les cultures, ATTENTION : NOMBREUSES COCCINELLES . is cas pour les mais très chétifs portant environ 300 paqer

sur 20 planten). Même dans ces cas là, il est proiórable d'attendre quelques - PUCERONS Toutes les cultures ont dépassé le stade 10 feuilles et BETTERAVES : couvrent le sol, il n'y a plus lieu d'intervenir .

- MONTEES A GRAINES : Cette année, la prolifération des betteraves montées à graines est un problème très grave. Leur élimination est donc nécessaire. Le binage est la meilleure méthode pour obtenir un résultat valable (80%) , à condition de les sortir des champs et de les détruire leur maturité se poursuivant même sur les tiges coupées. de la Valide de la Seine à l'Ouest de PARIS et le pourbour Sud de la fôret de

Pontaimebleau, qui devront être traitées en priorité,

DERNIERE MINUTE :

POMME DE TERRE : Là où les orages sont passés, protéger immédiatement par un produit pénétrant ou systémique.

: La région de la Chapelle la Reine nous signale des pontes importantes PYRALE : le traitement doit être avancé de quelques jours.

(C SPV, 1984) " Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation ".